WHOQOL-BREF

Utilité clinique du WHOQOL-BREF

- L'évaluation de la qualité de vie WHOQOL-BREF découle du WHOQOL-100 a été développée par le groupe WHOQOL en collaboration avec quinze centres de terrain internationaux, simultanément, dans le but de créer une évaluation de la qualité de vie applicable de manière transculturelle.
- En pratique clinique, les évaluations WHOQOL peuvent aider les cliniciens à juger des domaines dans lesquels un patient est le plus affecté par la maladie et à prendre des décisions de traitement. Combiné à d'autres mesures, le WHOQOL-BREF peut permettre aux professionnels de la santé d'évaluer les changements dans la qualité de vie au cours du traitement.

Informations supplémentaires

Administration	<p>Âge des répondant.e.s : 18 ans et plus</p> <p>Consigne : Les participants sont invités à évaluer leur qualité de vie, leur santé et d'autres aspects de leur vie en se basant sur leurs expériences des deux dernières semaines, en tenant compte de leurs standards, espoirs, plaisirs et préoccupations.</p> <p>Fréquence d'administration : À la CUP, le WHOQOL-BREF est administré une première fois au début du suivi avec tous les autres questionnaires, puis à la fin du suivi.</p>
Composition	<p>Nombre d'items : 26</p> <p>Échelle de réponse: Likert à 5 ancrés</p> <p>4 domaines mesurant la qualité de vie:</p> <ul style="list-style-type: none">- La santé physique- La santé mentale- L'environnement- Les relations sociales
Normes	Les scores des domaines varient entre 1 à 5
Interprétation	Pour chaque domaine de l'instrument, un score élevé indique une meilleure qualité de vie, tandis qu'un score faible indique une qualité de vie moindre.
Propriétés psychométriques	<p>Cohérence interne : L'étude de Skevington et al. (2004) a obtenu des alphas de Cronbach allant de modérés à acceptables pour les quatre domaines de l'instrument, soit : la santé physique (0,82), la santé mentale (0,81), l'environnement (0,80) et les relations sociales (0,68).</p> <p>Validité discriminante: L'instrument est capable de distinguer de manière significative les scores des participants malades de ceux en bonne santé pour chaque domaine, et ce, dans la majorité des 23 pays où l'étude de validation a été menée.</p>

Références

Organisation mondiale de la Santé. (1996). *WHOQOL-BREF: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version*. Genève : Organisation mondiale de la Santé. Repéré à http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63529_WHOQOL-BREF.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Skevington, S. M., Lotfy, M., & O'Connell, K. A. (2004). The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A Report from the WHOQOL Group. *Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care & Rehabilitation*, 13(2) 299–310. <https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00>