

Youth Outcome Questionnaire

Utilité clinique du YOQ®2.01

- Offre une vue d'ensemble rapide mais complète des perceptions des parents/tuteurs (ou de l'adolescent.e âgé.e de 12 à 17 ans) sur le fonctionnement actuel de l'enfant (ou adolescent.e).
- Les scores des sous-échelles, des items critiques, et des items individuels peuvent aider à identifier les domaines de préoccupation clinique immédiate et à contribuer à la planification du traitement.
- Le Y-OQ® est sensible aux changements à court terme (+7 jours), ce qui le rend utile pour évaluer les progrès des clients à tout moment pendant le traitement.

Informations supplémentaires

Administration	Âge des répondants : Enfants de 4 à 17 ans Consignes : ● Pour les enfant âgés de 4 à 11 ans: Les <u>parents/ tuteurs</u> des enfants sont encouragé.e.s à répondre à chaque question avec la plus grande précision possible. Ils doivent indiquer dans quelle mesure chaque déclaration est vraie pour eux au cours de la semaine écoulée. ● Pour les adolescent.e.s âgés de 12 à 17 ans: Les adolescent.es sont encouragé.es à répondre à chaque question avec la plus grande précision possible. Ils doivent indiquer dans quelle mesure chaque déclaration est vraie pour eux au cours de la semaine écoulée. Fréquence d'administration : À la CUP, le YOQ®2.01 est administré une première fois avec tous les autres questionnaires, puis de manière mensuelle.
Composition	Nombre total d'items : 64 Nombre de sous-échelles : 5 1) Détresse intrapersonnelle ; 2) Détresse somatique ; 3) Relations interpersonnelles ; 4) Problèmes sociaux ; 5) Dysfonctionnement comportemental Nombre d'items critiques : 9 ● Item 12 (Inquiétudes/ rumination) ● Item 20 (Voit, entend ou croit des choses qui n'existent pas) ● Item 21 (Automutilation/ idéations suicidaires) ● Item 28 (Croît que les autres veulent lui faire du mal) ● Item 38 (Croît qu'il peut entendre les pensées des autres ou qu'on peut entendre les siennes) ● Item 44 (Moment d'euphorie inhabituelle/ énergie excessive) ● Item 46 (Peur de devenir fou/folle) ● Item 51 (Colère menaçante pour autrui) ● Item 58 (Perte de poids sans raison médicale) Échelle de réponse: Likert à 5 ancrs

Interprétation	Dimension	Range (min-max)	Seuil clinique	Le parent / tuteur signale...
	Détresse intrapersonnelle	-4 à 68	> 17	... une grande détresse émotionnelle (ex : symptômes d'anxiété, de dépression, de peur) chez l'enfant.
	Détresse somatique	0 à 32	> 6	... une inquiétude concernant le nombre de problèmes physiques/somatiques manifestés par l'enfant (c.-à-d. maux de tête, problèmes d'estomac, problèmes intestinaux, étourdissements, etc.).
	Relations interpersonnelles	-6 à 34	> 5	... que l'enfant éprouve des difficultés interpersonnelles considérables avec ses parents, ses tuteurs, d'autres adultes et/ou ses pairs (c.-à-d. agression, défiance, conflit).
	Problèmes sociaux	-2 à 30	> 4	... <u>que</u> l'enfant présente un certain nombre de comportements qui violent les normes et/ou les attentes de l'école (ex : comportements délinquants ou agressifs, etc.).
	Dysfonctionnement comportemental	-4 à 40	> 13	... que l'enfant rencontre des difficultés d'attention, de concentration, d'impulsivité, d'organisation dans l'accomplissement des tâches et dans la gestion de la frustration.
	Items critiques	0 à 36	> 6	... qu'un ou plusieurs éléments nécessitent un suivi clinique plus immédiat.
	SCORE TOTAL	-16 à 240	> 47	... que l'enfant éprouve un niveau de détresse élevé.
	<i>*à interpréter de façon similaire pour la version auto-rapportée complétée par les adolescent(e)s âgé(e)s de 12 à 17 ans *</i>			
	Indice de changement fiable : Une différence de 13 points ou plus (+/-) entre l'administration de base et les mesures de suivi reflète un changement fiable (- 13 = détérioration et + 13 = amélioration).			
Propriétés psychométriques	Consistance interne			
	● Détresse intrapersonnelle ($\alpha = .91$), ● Détresse somatique ($\alpha = .78$), ● Relations interpersonnelles ($\alpha = .75$) ● Problèmes sociaux ($\alpha = .71$) ● Dysfonctionnement comportemental ($\alpha = .81$), ● Items critiques ($\alpha = .74$). ● Score total ($\alpha = .95$)			
Fiabilité test-retest				
● Corrélation test-retest élevé pour le score total ($r = .89, p < .001$) ● Corrélations test-retest modérées à élevées pour les scores des sous-échelles individuelles allant de $r = .68$ à $r = .86, p < .001$				

Références

Ridge, N. W., Warren, J. S., Burlingame, G. M., Wells, M. G., & Tumblin, K. M. (2009). Reliability and validity of the youth outcome questionnaire self-report. *Journal of clinical psychology*, 65(10), 1115–1126. <https://doi.org/10.1002/jclp.20620>